

VOCABULAIRE

DES MOTS TECHNIQUES EMPLOYÉS DANS LA FLORE


Dessins de M. A. JOBIN

(Les exemples figurés sont imprimés en italique.)

A


Acaule; plante sans tige aérienne apparente ou à tige si courte que les feuilles semblent naître de la racine : *Violette odorante*, *Gentiane acaule*.

Accrescent; organe continuant à végéter et à s'accroître après la floraison :




calice du *Physalis* (fig. 1), de l'*Androsace maxima*, styles de la *Benoite* (fig. 2).

Achaine, achène ou akène; fruit sec, indéhiscent, à 1 seule graine libre, c'est-




à-dire n'adhérant pas au péricarpe : *Soleil* (fig. 3), *Laitue*.

Aciculaires; feuilles linéaires, raides et aiguës



comme des aiguilles : feuilles du *Pin maritime* (fig. 4).


Acicules; petits aiguillons délicats, ordinairement droits, qui recouvrent



certains organes : *Rosa gallica* (fig. 5); *Rosa pimpinellifolia* (fig. 6).


Acotylédones ou Cryptogames; végétaux sans cotylédons et se reproduisant par des spores : Fougères, Prêles, Lycopodes.

Acuminé; organe dont le sommet se termine brusquement en *acumen*, c'est-



à-dire en pointe allongée et effilée : feuilles du *Bouleau* (fig. 7), du *Tilleul*.


Adhérent; organe attaché à un autre et faisant corps



avec lui : *ovaire et calice du Saxifraga granulata* (fig. 8).

Adventice; plante qui vient d'un pays étranger, plus ou moins éloigné, et qui n'a pas été semée : le *Zygophyllum Fabago*, à Cette.

Adventives; racines qui prennent naissance di-




rectement sur la tige : *Lierre*, *Fraisier*, *Violette odorante* (fig. 9).

Aigrette; faisceau ou couronne de poils ou de soies




terminant certains fruits : les akènes du *Crepis al-bida* (fig. 10).

Aigu; dont le sommet se rétrécit insensiblement




en pointe : feuilles de l'*Arenaria trinervia* (fig. 11).

Aiguillon; piquant naissant de l'écorce et se détachant



sans déchirer le bois : *Rosier* (fig. 12).

Aile; membrane mince ou foliacée accompagnant certains organes : les carpelles du *Thalictrum aquilegifolium*, la *silicule*




du *Lepidium arvense* (fig. 13); les deux sépales colorés du *Polygala* (fig. 14); les deux pétales latéraux des Papilionacées (voir ce mot); les tiges du *Genista sagittalis* (fig. 15).

Ailé; pourvu d'une ou plusieurs ailes.

Akène (voir Achaine).

Alternes; feuilles (parfois bractées ou fleurs) insérées une à une à des hau-




teurs différentes sur la tige ou les rameaux : *Tilleul* (fig. 16).

Alvéolé; marqué de petites fossettes anguleuses nommées *alvéoles* : réceptacle




de plusieurs Composées; fruit de la *Pimpinella* (fig. 17, agrandie).

Amplexicaule; feuille ou bractée à base élargie




embrassant plus ou moins la tige ou le rameau : *Pavot somnifère* (fig. 18).

Anastomosées; nervures ramifiées, saillantes, se réunissant entre elles en



réseau par leur sommet : bractée du *Tilleul* (fig. 19); calice du *Silene inflata* (fig. 20).

Ancipité; comprimé et à bords plus ou moins tran-



chants, comme un glaive à 2 tranchants : tige du *Poa compressa* (fig. 21).

Androgyne; épi formé de fleurs mâles et de fleurs



femelles groupées sur le même pédoncule : *Carex vulpina* (fig. 22).

Angiosperme; plante à ovules et graines renfermées dans un ovaire ou péricarpe : Pommier, Poirier, toutes les Dicotylédones et Monocotylédones.

Annuel; plante qui naît, se développe, se reproduit et meurt dans une même année végétative : Froment, Seigle, Sarrasin.

Anthère; partie terminale de l'étamine renfermant le pollen (voir fleur et étamine).

Anthèse; moment de la floraison d'une plante.

Anthode; synonyme de capitule : inflorescence des Composées.

Apétale; fleur dépourvue



de pétales : *Frêne* (fig. 23).

Aphyllé; plante ou tige dépourvue de feuilles : voir *Aphyllanthes monspeliensis*.


Apiculé; organe dont le sommet se rétrécit brusquement en pointe courte,



aiguë, peu consistante ; silicule du *Draba verna*;

gousse de la Lentille (fig. 24).


Appendice; partie accessoire à quelque organe :



calice du Campanula speciosa (fig. 25).


Appendiculé; muni d'appendices.

Apprimé; organe appliqué sur un autre, mais sans



y adhérer : *poils de la Renoncule bulbeuse* (fig. 26) et du *Potentilla verna*.

Aranéux; poils mous, fins, entrecroisés comme les fils d'une toile d'Araï-




gnée : *Sempervivum arachnoideum* (fig. 27); *Cirsium eriophorum*.

Arbre; végétal ligneux atteignant au moins 5 mètres de haut : Chêne, Orme, Peuplier, Pin.


Arbrisseau ou Arbuste; petit arbre de 1 à 5 mètres, à tige se ramifiant ordinairement dès la base : Fusain, Nerprun, Troëne, Genévrier.

Arête; pointe filiforme, raide, terminant un orga-



ne : *épillet de Seigle* (fig. 28), d'Avoine; *carpelles de la Clématite* (fig. 29).


Arille; expansion du funicule enveloppant plus ou



moins la graine : *Fusain* (fig. 30).

Aristé; organe muni d'une arête.


Article; portion d'organe se séparant d'elle-même, à une certaine époque, du reste de l'organe en



un point nommé *articulation* : *siliqua du Raphanus Raphanistrum* (fig. 31).


Articulé; organe formé d'articles : *siliqua articulée*.

Ascendant; étalé à la base,



puis redressé : *tige du Potentilla aurea* (fig. 32).

Atténué; qui diminue insensiblement de largeur




ou d'épaisseur, soit à la base, soit au sommet : *feuilles des Silene* (fig. 33).

Auriculé; muni à la base de 2 lobes ou oreillettes :



feuilles caulinaires du Camelina sativa (fig. 34).

Avorté; organe arrêté dans son développement : *sili-*



cules du Capsella gracilis (fig. 35) (forme du *C. Bursa-pastoris*).

Axe; ligne passant par le centre d'un corps; pédoncule commun sur le-



quel sont fixés les fleurs, les fruits, les pédicelles, etc. : *épi du Seigle* (fig. 36).

Axillaire ; placé à l'aiselle d'une feuille, d'une bractée, d'un rameau :




fig. 37), du Lierre terrestre.

B

Bacciforme ; fruit en forme de baie.



Baie ; fruit mou ou charnu, à graines éparses dans la



pulpe : Raisin, Groseille, Busserole, Laurier (fig. 38), Asperge (fig. 39).

Balsamique ; odeur analogue à celle du baume : Cistes.


Bec ; pointe terminale d'un fruit : *Erodium* (fig. 40),



Adonis (fig. 41), *Barbarea* (fig. 42).

Bi ; particule initiale ajoutant l'idée de deux au mot devant lequel elle est placée.

Bidenté ; à 2 dents : akè-




nes du *Bidens tripartita* (fig. 43).

Bifide ; fendu en 2 jusque vers le milieu de sa lon-




gueur : pétales du *Silene inflata* (fig. 44).

Biflore ; qui porte 2 fleurs :



péduncle du *Geranium columbinum* (fig. 45).


Bifurqué ; fendu en 2 branches partant du même point, comme une four-



che à 2 dents : rameau du *Spergula vulgaris* (fig. 46).


Bilabié ; divisé en 2 lèvres inégales, l'une supérieure, l'autre inférieure, et

dont la gorge reste ouverte : calice et corolle de




la Sauge (fig. 47) et de la plupart des Labiées.

Bilobé ; partagé en 2 lobes :





silicule de la Biscutelle (fig. 48).

Biloculaire ; partagé en 2 loges par une cloison : fruit




de la Lunaire (fig. 49) et de la plupart des Crucifères.

Bipartit ; divisé profondément jusqu'au delà du



milieu : calice des Ajoncs (fig. 50) ; pétales du *Draba verna* (fig. 51).

Bipennatifide; feuille d'abord pennatifide et dont



les segments secondaires sont également pennatifides: *Matricaire* (fig. 52).

Bipennatiséqu; feuille d'abord pennatiséquée et dont les segments secondaires sont également



pennatiséqués: *Aspidium aculeatum* (fig. 53), *Oenanthe pimpinelloides*.

Bipenné; feuille 2 fois pen-



née: *Osmunda regalis* (fig. 54), *Rue fétide*.

Bisannuel; plante qui ne fleurit et fructifie que la 2^e année, puis meurt: *Chou*, *Rave*, *Persil*.

Bisériel; disposé sur 2




rangs: *graines du Diplo-taxis* (fig. 55) et de plusieurs *Crucifères*.

Biterné; feuille 2 fois ter-



née: *Podagraire* (fig. 56).

Bivalve; fruit s'ouvrant par deux valves: *silicule de la Lunaire* (fig. 57) et




fruit de la plupart des *Crucifères* et des *Papilionacées*.

Bourgeon; organe ovoïde, écailleux, placé à l'ais-




selle des feuilles ou à l'extrémité des rameaux: *Poirier* (fig. 58).

Bractée; petite feuille ac-




compagnant les pédoncules ou les fleurs, et diffé-

rant des autres feuilles par sa forme ou sa cou-




leur: *Tilleul* (fig. 59), *Ornithogale* (fig. 60).

Bractéiforme; qui a la forme d'une bractée:



feuilles supérieures du *Globularia vulgaris* (fig. 61).

Bractéole; petite bractée accompagnant les pédi-



celles ou les fleurs: *Violette* (fig. 62), *Muguet* (fig. 63), *Scille*.


Bractéolé; muni de bractéoles ou de bractées.

Bulbe; souche courte et renflée ou bourgeon charnu, écailleux, plus ou




moins souterrain : Lis, Ail, Oignon, *Muscari* (fig. 64).

Bulbiforme; renflé en forme de bulbe *souche de*



la Renoncule bulbeuse (fig. 65).

Bulbiles; petits bulbes accompagnant les fleurs ou




les feuilles de certaines plantes : *Ail des vignes* (fig. 66).

Bulbilifère; qui porte des bulbiles.

C

Caduc; organe qui se détache et tombe de bonne




heure : feuilles du Poirier; *sépales du Coquelicot* (Fig. 67).

Caïeux; petits bulbes qui naissent à l'aisselle des écailles des bulbes : Ail cultivé, *Ail rose* (fig. 68).




Calathide; synonyme de capitule *voir ce mot*.

Calice; enveloppe extérieure de la fleur, formée



de sépales libres ou soudés : *Renoncule* (fig. 69), *Primevère* (fig. 70).

Caliciflore; plante dont les étamines sont insérées



sur le calice : *Rose*, *Potentille* (fig. 71), *Benoîte*.

Calicinal; du calice, qui appartient au calice.

Calicule; petit calice accessoire, placé à l'extérieur et formé de folioles



ou d'écailles : *Mauve*, *Potentille*, *Oeillet* (fig. 72).

Caliculé; muni d'un calicule.

Calleux; qui a des callosités, des renflements arides,

Callosités; renflements arides et raboteux qui se




développent sur certains organes : *Rumex conglomeratus* (fig. 73).

Campanulé; en forme de




cloche : *fleur des Campanules* (fig. 74).

Canaliculé; creusé d'un petit sillon en forme de




canal : *feuilles de l'Oeillet* (fig. 75), de la Carotte.

Cannelé; muni de côtes longitudinales régulières,




séparées par des sillons : *tige de la Berce* (fig. 76).

Capillaire; très grêle, fin et délié comme un che-




veu : *feuilles de l'Asperge* (fig. 77), des *Renoncules aquatiques*.

Capité; en tête arrondie :




stigmate du Chèvrefeuille (fig. 78).

Capitule, Anthode, Calathide; inflorescence à fleurs sessiles ou subsessiles et serrées en tête




sur un réceptacle commun, simulant une seule fleur : *toutes les Composées* (fig. 79).

Capsule; fruit sec, déhiscent ou non, contenant



ordinairement plusieurs graines : *Pavot* (fig. 80), *Réséda* (fig. 81).

Carène; saillie longitudinale du dos de certains organes, rappelant par sa forme la carène d'un bateau : *glumes du Phala-*



ris (fig. 82); *sépales de la Crucianelle* (fig. 83), réunion des 2 pétales inférieurs des *Papilionacées* (voir ce mot).

Caréné; muni d'une carène.

Caroncule, Strophiole; épaississement charnu et peu étendu de certaines graines : *Mœhringia, Lu-*



zula Forsteri (fig. 84 agrandie) et *Luzula pilosa, Violettes* (fig. 85 agrandie).

Carpelle; fruit rudimentaire ou partie d'un fruit



multiple : *fruit des Renoncules* (fig. 86 agrandie).

Carpophore, Gynophore, Thécapophore; petit sup-



port de certaines capsules : *Silene nemoralis* (fig. 87).


Cartilagineux; qui a la consistance et la couleur d'un cartilage : bord des feuilles de divers *Saxifrages*.

Caryopse; fruit sec, indéhiscent, à graine unique



soudée avec le péricarpe : *Froment* (fig. 88), *Seigle, Mais, Riz*.

Caulescent; plante pourvue d'une tige apparente, par opposition à *acaule* : *Violette des bois* (fig. 89).



Caulinaire; qui tient à la tige : *feuilles de la Violette des bois* (fig. 89).

Cespiteux; plante offrant à sa base des touffes compactes : plusieurs *Graminées* et *Saxifrages*.

Chagriné; couvert de petites granulations, comme




la peau de chagrin : *graines de plusieurs Arenaria* (fig. 90).

Chaton; fleurs sessiles à l'aisselle d'une écaille et formant par leur réunion



un épi qui se détache et tombe tout d'une pièce : *Chêne*, *Noyer*, *Noisetier* (fig. 91).


Chaume ; tige souvent creuse, munie de nœuds d'où partent des feuilles li-



néaires engainantes : toutes les *Graminées* (fig. 92).


Cilié ; bordé de cils.

Cils ; petits poils disposés sur un rang comme ceux




des paupières : feuilles des *Drosera* (fig. 93) et du *Draba aizoides*.

Claviforme ; en forme de massue ; capsule du *Pa-*



paver dubium (fig. 94), calice fructifère du *Silene Armeria* (fig. 96).

Cloison ; lame membra-



neuse partageant le fruit en 2 ou plusieurs loges qui renferment les graines : la *Lunaire* (fig. 97) et toutes les *Crucifères* à



fruit déhiscent, les *Pavots* (fig. 95).


Coloré ; qui a une couleur autre que la verte, par opposition à herbacé.

Commissure ; ligne ou surface d'union de deux or-



ganes, par exemple des *méricarpes des Ombellifères* (fig. 98).

Composées ; feuilles plus ou moins divisées en feuilles secondaires ou folioles : *Rose* (fig. 99) ; Capitules formés de plu-



sieurs petites fleurs étroitement groupées dans un involucre commun : *Marguerite*, *Arnica* et toutes les *Composées* (voir fig. 79).


Concolore ; d'une même couleur, par opposition à discolore.

Cône ; fruit composé, formé d'un axe et de nombreuses écailles, à la base desquelles sont les graines :




Pin (fig. 100), *Vergne* (fig. 101), *Houblon* (fig. 102).

Confluents ; organes se prolongeant inférieurement et se liant les uns aux au-




tres sans interruption : lobes du *Polypode commun* (fig. 103).

Connées ; feuilles opposées et soudées par la base :





Chèvrefeuille, *Chloreperfolié* (fig. 104).

Connectif ; petit corps unissant les 2 loges des anthères et se prolongeant




parfois au delà de leur sommet : *Salvia officinalis* (fig. 105), *Salvia glutinosa* (fig. 106).

Connivents; organes se rapprochant par le sommet sans se souder : *om-*




belle de la Carotte (fig. 107); *fleur d'Orchis morio* (fig. 108).

Coques; parties d'une capsule à plusieurs loges se séparant avec élasticité




et emportant leurs graines : *Euphorbia Characias* (fig. 109).



Cordé, cordiforme; en forme de cœur, l'échancrure en bas : *feuilles de la Ficaire* (fig. 110), *de la Violette* (fig. 111).



Coriace; tenace, flexible et plus ou moins épais comme le cuir : *feuilles du Buis, du Laurier-rose.*




Corolle; deuxième enveloppe de la fleur, située entre le calice et les éta-




mines, à divisions libres ou soudées : *Ficaire* (fig. 112), *Primevère* (fig. 113).

Corolliflore; plante dont les étamines sont insé-




rées sur la corolle : *Chèvrefeuille* (fig. 114).

Coronule; petite couronne d'appendices libres ou



soudés dans certaines corolles : *Narcisse, Jonquille* (fig. 115).

Corymbe; inflorescence dans laquelle les axes secondaires partent de



points différents et arrivent à peu près à la même hauteur : *Millefeuille* (fig. 116).


Cotonneux; à poils blanchâtres, longs, doux au



toucher : *Anémone Pulsatille* (fig. 117).

Cotylédon; nom donné à la première ou aux 2 premières feuilles sortant de la graine (*voir* Dicotylédone et Monocotylédone).


Crénelé; bordé de crénelures, c'est-à-dire de dents



obtusées ou arrondies : feuilles de la *Violette* (fig. 118), du *Lierre terrestre* (fig. 119).


Cryptogame (voir *Acotylédone*).

Cunéiforme; en forme de coin ou de triangle renversé : feuilles du *Saxi-*




fraga cuneata (fig. 120); silicule de la *Bourse-à-pasteur* (fig. 121).

Cupule; involucre écailleux, foliacé ou épineux, en forme de petite coupe,



qui enveloppe plus ou moins certains fruits : gland du *Chêne* (fig. 122).

Cuspidé; insensiblement atténué en pointe aiguë et



raide : dents des feuilles du *Châtaignier* (fig. 123). **Cylindrécé**; approchant de la forme cylindrique.




Cyme; groupe de fleurs sur des pédoncules rameux partant du même point et arrivant à une même hauteur : *Alsine tenuifolia*, *Joubarbe* (fig. 124).

D


Décombant; qui ne peut se soutenir et se laisse tomber en bas et en dehors : *Rosa arvensis*, *Lotus decumbens*.

Décurrent; feuilles dont le limbe se prolonge inférieurement en aile folia-



cée sur la tige et les rameaux : *Bouillon-blanc* (fig. 125).

Déhiscents; fruits ou anthères qui s'ouvrent naturellement à la maturité




pour laisser tomber les graines ou le pollen : capsule épineuse du *Maronnier d'Inde* (fig. 126).

Deltôide; en forme de delta ou de triangle : feuilles du *Bouleau* (voir fig. 7); périanthe de l'*Atriplex hastata*.

Demi-fleur; fleurette de fleur composée, déjetée en languette plane et unilatérale : les *Hieracium* (fig. 127) et toutes les semi-flosculeuses.




Denté; bordé de dents, c'est-à-dire de petites échancrures triangulaires



égales ou inégales : feuille de l'*Ortie dioïque* (fig. 128).

Dentelé, denticulé; bordé de dents fines ou superficielles, appelées dente-




lures ou denticules : feuille du *Nerprun* (fig. 129).


Déprimé; comprimé verti-



calement : fruit de la *Cynoglossa* (fig. 130).

Diadelphes; étamines soudées par leurs filets en






Drupacé; fruit ayant à peu près la consistance d'une



drupe : *Térébinthe* (fig. 146).

Drupe; fruit charnu, succulent, indéhiscent, renfermant un noyau à une




seule graine : *Cerise*, *Prune* (fig. 147), *Pru-neau*, *Abricot*, *Pêche*.

Drupéole; petite drupe : fruits de la *Ronce*.


E

Ecailles; petites lames minces et coriaces, parfois charnues, qui accompa-




gnent ou protègent certains organes : *Lathræa squamaria* (fig. 148), *Aspidium aculeatum*.

Echancré, émarginé; qui présente une échancrure ou entaille peu profonde :



Silicule des Iberis (fig. 149), *des Lepidium* (fig. 150).

Elliptique; en forme d'ellipse ou courbe régulière plus longue que large et



rétrécie du milieu vers les 2 bouts : feuilles du *Muguet* (fig. 151), du *Sceau-de-Salomon*.

Engainant; formant une gaine, c'est-à-dire un étui ou long anneau autour



d'un autre organe : *feuilles de la Brize* (fig. 152) et de toutes les Graminées.

Ensiforme; en forme de lame d'épée : *feuilles de*



l'Iris (fig. 153); *bec de la silique du Sinapis alba* (fig. 154).



Entre-nœuds (voir méristhalles).

Épars; disposé sans aucun ordre : *feuilles du Lin*



(fig. 155), de la *Linaire*, du *Lycopodium clavatum*.

Éperon; prolongement tubuleux du calice ou de la corolle au-dessous de la



fleur : *Ancolie*, *Pied-d'Alouette* (fig. 156), *Linaire*.


Éperonné; offrant un ou plusieurs éperons.

Épi; sorte de grappe dont les fleurs sont sessiles ou



subsessiles sur un axe simple : Froment, Seigle, *Crucianelle* (fig. 157).


Épigé ; placé à la surface et se montrant hors du



sol : souche du *Plantago carinata* (fig. 158).

Épigyne ; inséré au-dessus du pistil : étamines des Corolliflores (voir ce mot).

Épillet ; petit épi formé par une ou plusieurs fleurs, portant à la base 1 ou




2 glumes : *Briza* (fig. 159), *Brome* (fig. 160), *Isolepis* (fig. 161), et toutes les Graminées.

Épine ; pointe droite et aiguë, faisant corps avec la tige, les rameaux ou un autre organe, et ne pou-




vant en être détachée sans déchirer les fibres : *Prunellier*, *Aubépine*, *Gro-seillier épineux* (fig. 162).

Érodé ; à bords irrégulièrement dentés et comme



rongés : feuilles de la *Laitue vireuse* (fig. 163).


Étamines ; organes mâles de la fleur, situés entre



la corolle et le pistil, et composés du filet et de l'anthère (fig. 164).


Étendard ; pétale supérieur, ordinairement plus grand, de la corolle des Papilionacées (voir ce mot).

Exsert, saillant ; qui fait saillie en dehors, par opposition à inclus : *étami-*



nes de l'*Allium sphaerocephalum* (fig. 165), style du *Thlaspi alpestre* (fig. 166).

Extra-axillaire ; qui paraît situé en dehors de l'aisselle de la feuille : vrilles et pédoncules de la *Bryone* (fig. 167), fleurs du *Lin extra-axillaire* (fig. 168).




Extorses ; anthères qui s'ouvrent vers le dehors de la fleur : *Hellébore*, *Anémone* (voir introrse).

F

Facies ; aspect général et port d'une plante à première vue.

Falciforme ; en forme de faux ou de faucille : *carpelles du Ceratocephalus*




falcatus (fig. 169) ; gousses de la *Trigonelle de Montpellier* (fig. 170).

Fasciculé ; réuni en fais-



ceau, en assemblage d'organes rapprochés en long :




fleurs du Cerisier (fig. 171), feuilles du Berberis (fig. 172).

Fastigiés; rameaux rappro-




chés et dressés : *Pastel* (fig. 173).

Feuille; organe des plantes, le plus souvent de couleur verte, composé du



limbe et du pétiole : feuille du Tilleul (fig. 174).

Fibreuse; racine formée de filaments simples ou peu rameux : nombreux




ses Renoncules et Graminées : racine d'*Eragrostis Barrelieri* (fig. 175).

Fide; terme toujours accompagné d'un préfixe, indiquant qu'un organe, plus étroit qu'un lobe, est fendu jusque vers son milieu (voir palmatifide et pennatifide).


Filet; partie inférieure de l'étamine qui supporte l'anthère (voir étamine).

Filiforme; fin et allongé comme un fil : feuilles




du *Ranunculus fluitans* (fig. 176).

Fimbrié; à bord découpé comme une frange : pé-




tales du *Dianthus superbus* (fig. 178).

Fistuleux; cylindrique et creux en dedans, comme




une flûte : tige de la *Ciguë* (fig. 177); chaume des Graminées.

Fleur; appareil de la fructification composé, lorsque la fleur est complète, du calice, de la corolle, des étamines et du pistil : Tilleul (fig. 179).




Fleuron; fleurette tubuleuse, régulière, ordinaire



ment à 5 dents : *Bluets*, *Chardons* et *Centaurees* (fig. 180).

Flexueux; plié ou courbé plusieurs fois en zigzag :



axe de l'épi de l'*Ivraie* (fig. 181).


Floconneux; qui porte des flocons de poils : *Bouillon-blanc*, *Scorzonère*.

Flosculeux; fleur composée formée uniquement de fleurons (voir ce mot).

Foliacé; qui a l'apparence d'une feuille : *involucre*




de l'*Anémone des bois* (fig. 182); *stipules* du *Pois* (fig. 183).



183


Foliole; division d'une feuille composée, d'un invo-



184

lucre ou d'un périanthe : *feuille du Rosier* (fig. 184).

Follicule; sorte de capsule s'ouvrant par une seule suture longitudinale, où



185

sont attachées les graines : *Hellébore*, *Pied-d'Alouette*, *Ancolie* (fig. 185).


Fossette; petite cavité :



186

graines de l'Euphorbia segetalis (fig. 186).

Fronde; feuille des Fougères portant les fructi-



187

fications sur la face inférieure : *Scolopendre* (fig. 187).

Fructifère; qui porte le fruit : calice fructifère.

Frutescent; qui a la consistance d'un arbrisseau ; *Rue fétide*.

Funicule; cordon ombilical ou filet rattachant



188

l'ovule au placenta : *gousse du Robinier* (fig. 188).

Fusiforme; en forme de fuseau, c'est-à-dire renflé au milieu et atténué aux




189

2 bouts : *hampe de l'Oignon*; *capsule et graines du Narthecium ossifragum* (fig. 189).

G

Gaine; base de certaines feuilles, bractées ou involucre se prolongeant



190

191

sur la tige et l'entourant complètement : *Armeria*, *Graminées* (fig. 190); *Prêles* (fig. 191).

Gamosépale, gamopétale; synonymes de monosépale, monepétale.


Géminés; organes disposés 2 à 2 sans être opposés :




192

feuilles du Pin, fleurs de la Vesce cultivée (fig. 192).

Géniculé, genouillé; plié brusquement, en faisant un angle, en forme de



193




194

genou : *arêtes de l'Avoine* (fig. 193), *tige de l'Alopecurus geniculatus* (fig. 194).

Gibbeux; muni d'une ou plusieurs gibbosités.

Gibbosité; bosse qui accompagne certains organes :




195

sépales de plusieurs Crucifères (fig. 195).

Glabre; dépourvu de poils : *Buis*, *Chou*, *Persil*.

Glabrescent; presque glabre : Cresson.

Glande; organe ordinairement vésiculeux sécrétant des liquides de nature variée : *Rosa rubiginosa*, gousse de l'*Adénocarpe* (fig. 196, avec détail fortement agrandi).




Glanduleux; muni de glandes.

Glaucéscent; presque glauque : Fumeterre.

Glaucque; d'un vert bleuâtre ou bleu de mer : Chou.

Glomérule; groupe de fleurs subsessiles réunies en




têtes serrées : *Trifolium glomeratum*, *Cuscuta* (fig. 197).

Glumacé; de la nature écailleuse des glumes :



Scirpus palustris (fig. 198) et les autres Cypéracées.

Glume; bractée qui entoure la base des épillets dans




les Graminées : *Bromus squarrosus* (fig. 199).

Glumelle; bractée qui forme l'enveloppe extérieure de chaque fleur de l'épillet : Graminées : *Bromus squarrosus* (fig. 200).


Glutineux; gluant et visqueux : Vergne.

Gorge; entrée du tube du calice monosépale ou de




la corolle monopétale : *Sauge* (fig. 201).

Gousse; fruit sec, à 1 seule loge, le plus souvent s'ouvrant en 2 valves, dont




chacune porte une rangée de graines : Haricot, Pois, *Genêt* (fig. 202).

Graminiforme, **graminoïde**; linéaire, étroit, à nervures parallèles, sem



blable à une feuille de Graminée : feuilles du *Ranunculus gramineus* (fig. 203).

Granuleux; qui porte des



tubercules en forme de petits grains : souche du *Saxifraga granulata* (fig. 204).

Grappe; inflorescence formée d'un axe primaire allongé, portant des axes



secondaires ou rameaux terminés chacun par une fleur : *Cytisus Laburnum* (fig. 205).

Grêle; mince et fluet : *Al-sine tenuifolia*.

Grimpant; qui ne peut s'élever qu'à l'aide d'un appui auquel il se fixe soit par des vrilles, soit par des racines : Lierre, Bryone, Pois.

Gymnosperme; plante à ovules et graines nues, non renfermées dans un ovaire ou péricarpe : Pin, Sapin, Cyprès et toutes les Conifères.

Gynophore; synonyme de Carpophore.

Gynostème; sorte de colonne de la fleur des Orchidées, formée par le




style et les étamines soudés ensemble : *Ophrys apifera* (fig. 206) et autres Orchidées.

H

Habitat; localité ou région où se rencontre une plante.

Hampe; pédoncule nu, partant de la souche et portant une ou plusieurs fleurs : *Primevère*.

Hasté; en forme de fer de hallebarde, muni à la base de 2 lobes étalés ho-




izontalement : *Rumex Acetosella* (fig. 207), *Atriplex hastata* (fig. 208).

Herbacé; vert ou ayant la consistance molle de l'herbe, par opposition à coloré ou à ligneux.

Hérissé; garni de poils droits et un peu raides : *Lepidium hirtum*.

Hermaphrodite; fleur pourvue d'étamines et de pistils : la *Renoncule* et la plupart des plantes vasculaires.

Hétéracanthe; tige ou rameau hérissé d'aiguil-




lons dissemblables, d'aiguillons et d'acicules : *Rosa pimpinellifolia* (fig. 209).

Hétérophylle; ayant des feuilles de différentes

formes : *Ranunculus aquatilis*.

Hile; cicatrice laissée par



le funicule sur la graine : *Pois* (fig. 210).

Hispide; garni de poils longs, raides et presque piquants : *Bourrache*, *Vipérine* et la plupart des *Borraginées*.

Hispidule; un peu hispide : *Myosotis*.

Homophylle; à feuilles toutes semblables, par opposition à hétérophylle : *Ranunculus fluitans*.

Hybride; plante provenant d'une espèce dont la graine a été fécondée par une autre espèce presque toujours du même genre : *Primula variabilis* = *P. vulgaris* × *officinalis*. Toujours désigné par le signe ×.


Hypocratériforme; en forme de soucoupe, à tube étroit et long, terminé



par un limbe brusquement évasé : *Pervenche* (fig. 211); *Laurier-rose* (fig. 212).

Hypogé; qui se développe sous terre : souche du *Plantago serpentina*.


Hypogyne; inséré au-dessous de l'ovaire : *étami-*



nes de la *Renoncule* (fig. 213) et de toutes les *Thalamiflores*.

I

Imbriqué; à parties se recouvrant à moitié comme les tuiles d'un toit : *feuille-*




les du *Thuya* (fig. 214), *Juniperus phœnicea* (fig. 215), *Lycopodium* (fig. 216).

Imparipenné; feuille composée-pennée, terminée




par une foliole impaire : *Frêne*, *Noyer*, *Térébinthe* (fig. 217).




Incisé; offrant des découpures profondes et inégales : *feuilles du Lamium incisum* (fig. 218).

Inclus; renfermé, qui ne dépasse pas les bords de l'organe qui l'enveloppe,



219



220

par opposition à exsert : *étamines de la Primevère* (fig. 219), *style du Thlaspi perfoliatum* (fig. 220).
Indéhiscents; fruit ne s'ouvrant pas naturellement




221

à la maturité : *silicule du Pastel* (fig. 221).

Inerme; dépourvu d'épines ou d'aiguillons, par opposition à épineux ou aiguillonné : *rameaux de la Rose des Alpes*.

Infère; ovaire placé au-dessous du calice et des




222

autres parties de la fleur : *Epilobe* (fig. 222), *Campanule*.

Inflorescence; disposition des fleurs sur une même plante : Capitule, Chaton, Corymbe, Cyme, Epi, Grappe, Ombelle, Spadice, Thyse (*voir ces mots*).

Infundibuliforme; qui a la forme d'un entonnoir :



223



224

corolle de la Primevère (fig. 223); *du Jasmin jaune* (fig. 224).

Introrse; anthère dont la suture s'ouvre vers le centre de la fleur : *Pivoine*, *Campanule*. Par opposition à extrorse (*voir ce mot*).

Involucelle; petite collette de bractées à la base d'une ombellule; un



225

Involucres.....
+ *Involucelle*

grand nombre d'Ombellifères : *Orlaya grandiflora* (fig. 225).

Involucre; réunion de bractées, verticillées ou imbriquées, insérées à la base d'une ombelle, d'un



226

involucre ou de toute autre inflorescence : *Centaurea Jacea* (fig. 226).

Irrégulier; organe dont les parties ne sont pas égales et symétriques : fleur de l'Aconit, de la Violette.

L

Labelle, *tablier*; division intérieure en forme de lèvre ou de tablier, souvent pendante et éperon-



227




228

née, de la fleur des Orchidées : *Orchis bifolia* (fig. 227) et *purpurea* (fig. 228).

Labié; calice ou corolle dont le limbe forme 2 lèvres ou une seule et dont la gorge reste ouverte (*voir bilabié et unilabié*).

Lacinié; découpé en lanières étroites et iné-



229

gales : pétales du Réséda, du *Dianthus monspessulanus* (fig. 229).

Laiteux; à suc blanc comme le lait : Coquelicot, Euphorbes.


Lancéolé; en forme de fer de lance, atténué aux deux bouts, plus longue-



230

ment au sommet : *feuilles du Laurier* (fig. 230), du *Polygone*.

Lanière; segment étroit et allongé : *feuilles du Ra-*




231

nunculus fluitans (fig. 231).

Lenticulaire; en forme de lentille, convexe sur les deux faces et à bords amincis : *Lentille*.


Libre; organe non soudé avec un autre : *ovaire*



232

des Renonculacées (fig. 232).

Ligule; petite membrane située au sommet de la




233

gaine des Graminées et embrassant le chaume : *Brize* (fig. 233).

Limbe; partie élargie d'une feuille ou d'un pétale (*voir ces mots*).

Linéaire; allongé, plan et presque également étroit




234

dans toute sa longueur : *feuilles de l'OEillet* (fig. 234), du *Lin* et de toutes les Graminées.

Lisse; n'offrant aucune aspérité.

Lobe; divisions arrondies d'un organe; en parlant d'une feuille : divisions larges, séparées par des échancrures arrondies et



235




236

n'allant pas jusqu'à la nervure médiane : *feuilles radicale* (fig. 235) et *caulinaire* (fig. 236) d'un *Erodium*, montrant des lobes.

Lobé; qui offre plusieurs lobes : un grand nombre de feuilles.


Lobule; petit lobe, lobe secondaire étant au princi-



237

pal ce que celui-ci est à la feuille entière : *feuilles des Thalictrum* (fig. 237).

Loge; cavité intérieure d'un fruit ou d'une anthère :



238

capsule du Réséda (fig. 238) vue horizontalement et verticalement.

Lyrée; feuille pennatifide ou pennatiséquée, terminée par un lobe élargi et ar-



239

rondi bien plus grand que les autres : *Barbarea* (fig. 239), *Lampsana*.

M


Marcescent; se desséchant et se flétrissant sur place sans tomber : *feuilles du Chêne*; corolles du *Trèfle*, des *Campanules*, des *Orchidées*.

Marginal; de la marge, du bord : *côtes marginales*



240

du fruit des Umbellifères (fig. 240).



241



242

Marginé; entouré d'un rebord : fruit du *Tordylium apulum* (fig. 241); feuilles de plusieurs *Primevères* (fig. 242) et *Saxifrages*.

Membraneux; souple, mince et transparent comme une membrane : cloison de la silicule de la *Lunaire*.

Méricarpes; les 2 carpelles monospermes qui constituent le fruit des *Ombellifères* : *Carotte*, *Persil* (fig. 243), *Cerfeuil* (fig. 244).



Mérithalles ou **entrenœuds**; intervalles nus,



compris entre 2 nœuds d'une tige : *Prêle* (fig. 245).


Monadelphes; étamines soudées par les filets en



un seul faisceau : *Mauve* (fig. 246) et *Guimauve*.


Moniliforme; présentant des articles renflés et des étranglements en forme de chapelet : souche de l'*Avena precatória* (fig. 247).

Monocéphale; qui ne porte qu'un capitule : tige du




Pissenlit, du *Serratula nudicaulis*.

Monochlamydée; plante n'ayant qu'une seule enveloppe florale, verte ou



colorée : *Epinard*, *Daphne*, *Aristolochie* (fig. 248) et toute la classe des *Monochlamydées*.

Monocotylédone; à un seul Cotylédon : le *Blé* (fig.




249) et toutes les *Monocotylédones*.

Monogyne; à 1 seul pistil :




Cratægus monogyna (fig. 250).

Monoïque; plante dont les fleurs à étamines et les fleurs à pistil sont distinctes, mais portées sur le même pied : *Noisetier* (fig. 251), *Chêne*, de nombreux *Carex* (fig. 252).



Monopétale ou **gamopétale**; corolle dont les divisions sont plus ou




moins soudées entre elles : *Primevère* (fig. 253), *Bourrache*.

Monosépale ou **gamosépale**; calice dont les divisions sont plus ou




moins soudées entre elles : *Silène enflée* (fig. 254), *Primevère*.

Monosperme; fruit à 1 seule




graine : *silicule* du *Neslia* (fig. 255).

Mucroné; brusquement terminé en pointe courte et raide appelée *mucron* :



calicule de l'Oeillet (fig. 236), involucre du Bupleure aristé (fig. 237).


Mucronulé; terminé en pointe ou mucron peu



saillant : feuilles et involucre de plusieurs Euphorbes (fig. 238).

Multicaule; souche ou racine produisant plusieurs tiges.

Multifide; très découpé, divisé en lanières nombreuses : feuilles des Re-



noncules aquatiques, de la Nigelle, du Senecio adonidifolius (fig. 239).


Multiflore; portant un grand nombre de fleurs.

Multiloculaire; offrant de



nombreuses loges : capsule du Lin (fig. 260).

Multipartit; offrant des partitions nombreuses : feuilles du Ranunculus bulbosus (fig. 261) et Chardons.



Muriqué; muni de pointes courtes et robustes : car-



pelle du Ranunculus muricatus (fig. 262).


Mutique; dépourvu d'arête ou de pointe distincte, par opposition à mucroné ou aristé.

N

Napiforme; en forme de Navet.

Naturalisé; végétal qui s'est propagé de lui-même dans un pays et y vit comme les plantes indigènes : Erigeron canadense.

Nectaire; organe glanduleux de certaines fleurs sécrétant un liquide su-




cré nommé nectar : Renoncule (fig. 263), Fritillaire (fig. 264).

Nectarifère; muni d'un ou plusieurs nectaires.

Nervation; disposition des nervures dans une feuille: nervation pennée, palmée, etc.

Nervé; pourvu de nervures saillantes.

Nervure; prolongement et ramification du pétiole ou du pédoncule dans le limbe formant la charpente des feuilles, des




sépales, des silicules, etc. **Nervure médiane** : celle qui prolonge le pétiole et partage la feuille en deux parties.

Nœud; point d'insertion d'une feuille sur une tige



renflée et comme articulée en cet endroit : toutes les Graminées (fig. 266). **Noueux**; garni de distance en distance de nœuds ou



renflements : souche du Phalaris nodosa (fig. 267). **Noyau**; boîte dure et osseuse qui enveloppe la



graine de certains fruits : Cerisier, Prunier (fig. 268), Térébinthe (fig. 269).

Nu; organe privé des appendices ou des enveloppes qui l'accompagnent ordinairement : tige nue, c'est-à-dire sans feuilles.


O

Obconique; en forme de




cône renversé : fruit de l'*Aigremoine* (fig. 270).

Obcordé; en cœur renversé, l'échancrure en haut :




folioles de l'*Oxalis stricta* (fig. 271).

Oblong; bien plus long que large et arrondi aux deux





bouts : feuilles du *Troëne* (fig. 272), de l'*Epurge* (fig. 273).




Obovale; en ovale dont la plus grande largeur est en haut : feuilles du *Samolus* (fig. 274), de la *Busserole* (fig. 275).

Obtus; à sommet arrondi, non aigu : feuilles de l'*Amélanchier* (fig. 276),



de la *Busserole* (fig. 275), sépales de la *Violette odorante* (fig. 277).



Ochrea; petite gaine de la base du pétiole des Polygonées et des pédicelles



de certains *Carex* : *Polygonum maritimum* (fig. 278) et *Persicaria* (fig. 279).

Oligosperme; à graines peu nombreuses.

Ombelle; inflorescence dont les rameaux partant du même point s'élèvent à



la même hauteur, en divergeant comme les rayons d'un parasol : les *Ails* (ombelle simple, fig. 280) et les *Ombellifères* (ombelle composée, fig. 281).


Ombellule; petite ombelle portée au sommet des rameaux d'une ombelle composée : Carotte, Liserpitium et la plupart des *Ombellifères*.

Ombiliqué; offrant au centre une dépression nom-



mée ombilic : *Umbilicus*, Pomme, Poire, fruit de l'*Aubépine* (fig. 282).

Onciné ou Unciné; terminé par une petite pointe courbée en crochet ou en



hameçon : involucre de la *Bardane* (fig. 283), calice du *Scleranthus uncinatus* (fig. 284).


Onglet; partie inférieure et plus ou moins rétrécie du pétale (voir ce mot).

Onguiculé; pétale pourvu d'un onglet : *Œillet*, *Nielle*.

Opercule; sorte de couvercle constituant la partie supérieure de la *Pyxide*


et se détachant circulairement à la maturité (voir pyxide).

Opposé; organes situés deux à deux au même ni-




veau et vis-à-vis l'un de l'autre : *feuilles du Buis* (fig. 285), du Millepertuis.

Oppositifolié; inséré du côté opposé d'où naît la




feuille : *vrilles de la Vigne*, de la *Bryone* (fig. 286).


Orbiculaire; arrondi en forme de cercle : *gousse du*




Medicago orbicularis (fig. 287).



Ovaire; partie inférieure du Pistil, renfermant les ovules : *ovaire supère ou libre*, *Primevère* (fig. A), *ovaire infère ou adhérent*, *Groseillier* (fig. B).




Ovale; ayant la forme d'un œuf, plus large à la base :



feuilles de l'Androsème (fig. 288), de la *Grande-Pervenche*.

Ovoïde; se rapprochant de




la forme ovale : *feuilles du Buis* (fig. 289).

Ovule; jeune graine attachée au placenta par le funicule (voir funicule).


P

Paillettes; petites lames scarieuses accompagnant les fleurons sur les réceptacles de plusieurs Dipsacées et Composées :



Dipsacus silvestris (fig. 290).



Palais; renflement fermant plus ou moins la gorge



de quelques corolles irrégulières : *Muflier*, *Linnaire* (fig. 291).

Paléacé; réceptacle garni de paillettes.

Palmatifide; feuille palmée, à divisions atteignant environ le milieu





du limbe : *Geranium pyrenaicum* (fig. 292) et *lucidum* (fig. 293).

Palmatilobé; feuille palmée, à divisions assez




profondes, mais n'atteignant pas le milieu du limbe : *Erable* (fig. 294).

Palmatipartite ; feuille palmée, découpée en lobes jusqu'au delà du milieu ou presque jusqu'à sa




base : *Ranunculus nemorosus* (fig. 295), *Geranium nodosum*, *Sanicle* (fig. 296).

Palmatiséquué ; feuille palmée, profondément découpée en segments à



peine soudés à la base et complètement distincts : *Aconit* (fig. 297).

Palmé ; feuilles à lobes divergents, imitant une main ouverte ou une patte d'oie (voir digité).




Panduriforme ; échancré sur les côtés en forme de violon : *feuilles du Rumex pulcher* (fig. 298).

Panicule ; inflorescence dans laquelle les axes secondaires, plus ou moins ramifiés, vont en décrois-




sant de la base au sommet : *Avoine*, *Milium effusum*, *Artemisia campestris* (fig. 299).

Papilionacée ; corolle irrégulière en forme de Papillon, composée de 5 pétales inégaux, 1 étendard, 2 ailes et 1 carène formée



de 2 pétales plus ou moins soudés : *Genêt* (fig. 300), *Cytise*, *Trèfle*, *Vesce*, *Pois* et toute la famille des *Papilionacées*.


Papilles ; petites rugosités rapprochées, coniques ou granuleuses : *capsule de*



l'Euphorbia papillosa (fig. 301), *graines du Spargula vulgaris* (agrandies, fig. 302).

Parasite ; végétal qui vit aux dépens d'un autre végétal vivant : *Gui*, *Orobanche*, *Cytinet*.

Paripenné ; feuille composée-pennée, ayant un




nombre pair de folioles : *Lentique* (fig. 303), *Pois*, *Vesce*, *Gesse*.

Partition ; division (voir pennatifid, tripartit).


Pauciflore ; ne portant qu'un petit nombre de fleurs : *Pois*.

Pectiné ; à divisions étroites et opposées sur deux rangs comme les dents



d'un peigne : *feuilles des Myriophyllum* (fig. 304), de l'*If*.


Pédalé ; à segments parallèles, le moyen libre, les latéraux plus ou moins



longuement unis à la base : *feuilles de l'Hellébore* (fig. 305).

Pédicelle ; support de chaque fleur, quand le pédoncule est ramifié : *Vicia Craca* (fig. 306), *Pois*.


Pédicellé ; fleur ou fruit muni d'un pédicelle.



Pédoncule; support d'une ou plusieurs fleurs (voir fig. 306).


Pédunculé; porté par un pédoncule, par opposition à sessile.

Pelté; orbiculaire et fixé par le centre : feuilles de




l'Hydrocotyle (fig. 307), de la Capucine.

Pennatifide; feuille pennée, à lobes atteignant à peu près le milieu de




chaque demi-limbe : *Senecion commun* (fig. 308), *Verveine* (fig. 309).

Pennatilobé; feuille pennée, à lobes assez profonds, mais n'atteignant pas le milieu de chaque




demi-limbe : *Sorbus torminalis* (fig. 310).

Pennatipartite; feuille pennée, à partitions dépassant le milieu de chaque



demi-limbe : *Coquelicot* (fig. 311), plusieurs *Cirsium* (fig. 312).




Pennatiséqué; feuille pennée, à segments atteignant tout à fait ou presque la nervure médiane : *Panaïs* (fig. 313), *Filipendule* (fig. 314).

Penné; feuilles dont les folioles sont disposées de chaque côté du pétiole



commun comme les barbes d'une plume : *Robnier*, *Fraxinelle* (fig. 315), *Vesce*.


Pentamètre; à 5 divisions



ou parties : fleur de la *Quintefeuille* (fig. 316).


Pérennant; qui peut vivre plusieurs années : *Cerastium triviale*.

Perfolié; feuille embrassant si bien la tige que celle-ci paraît traverser



son limbe : *Bupleurum rotundifolium* (fig. 317), *Chlora perfoliata*.

Périanthe, Périgone; enveloppe florale remplaçant le calice et la corolle des Monochlamydées et des Monocotylédones : *Lis*, *Colchique* (fig. 318).



Péricarpe ; enveloppe du fruit provenant des parois de l'ovaire à maturité : peau du Blé, du Sarrasin.

Péricline ; synonyme de involucre (*voir ce mot*).

Périgyne ; inséré autour de l'ovaire sur les bords du réceptacle : étamines de la Rose et des Caliciflores (*voir ce mot*).


Persistant ; durant au delà du terme où les mêmes organes sont caducs : styles de la Clématite ; feuilles restant vertes pendant l'hiver : Buis, Laurier.

Personé ; corolle en forme de masque, à 2 lèvres, à gorge fermée par une




saillie appelée Palais : *Mufler* (fig. 319) ; *Linnaire* (fig. 320).

Pétale ; l'une des folioles ou divisions de la corolle,




ordinairement composée du limbe et de l'onglet : *Oeillet* (fig. 321).

Pétaloïde ; ayant l'aspect et la couleur d'un pétale,



d'une corolle : *Anémone Pulsatilla* (fig. 322), *Daphne*, *Aristolochie*.

Pétiole ; support ou queue de la feuille (fig. 323).




Pétiolé ; muni d'un pétiole, par opposition à sessile.

Pétiolule ; petit pétiole de chaque foliole d'une feuille composée : *Vesce* (fig. 323).

Pétiolulé ; muni d'un petit pétiole ou pétiolule.


Phanérogame ; plante se reproduisant par des étamines et des pistils : *Renoncule* et toutes les plantes ayant de véritables fleurs.

Piriforme ; en forme de




Poire (fig. 324), ou de *Figue*.

Pistil ; organe femelle et central de la fleur phanérogame, comprenant or-



dinairement l'ovaire, le style et le stigmate : *fleur du Colchique* (fig. 325).

Pistillé, carpellé ; fleur ne portant que le pistil ou des carpelles : Chan-



vre femelle, *châtons femelles des saules* (fig. 326).


Pivotante ; racine principale, bien plus développée que les radicelles,



s'enfonçant verticalement dans le sol : *Carotte sauvage* (fig. 327).

Placenta ; tissu de l'ovaire sur lequel les ovules sont attachés au moyen du funicule (*voir ce mot*).

Plumeuse ; muni de poils rameux ou rangés sur deux rangs, comme les



barbes d'une plume :
aigrette des Cirsium (fig. 328).

Pluriflore ; qui porte plusieurs fleurs : Tilleul.

Poilu ; garni de poils longs et distincts.

Pollen ; poussière fécondante de la fleur, renfermée dans les loges de l'anthère.

Polycéphale ; qui porte plusieurs capitules : Se-



neçon commun, *Serratula tinctoria* (fig. 329).


Polygame ; plante portant sur le même pied des fleurs à étamines, des



fleurs à pistil et des fleurs hermaphrodites : Pariétaire, *Pimprenelle* (fig. 330).


Polymorphe ; de forme très variable : silicule du *Draba verna*.

Polypétale, dialypétale ; corolle formée de plu-




sieurs pétales libres : *Ficaire* (fig. 331), *Renoncule*.

Polyphylle ; involucre ou involucelle à folioles



nombreuses : Carotte, *Libanotis montana* (fig. 332).

Polysépale, dialysépale ; calice formé de plusieurs



sépales libres : Renoncule, *Hellébore* (fig. 333).
Polysperme ; fruit à grai-



nes nombreuses : *Coquelicot* (fig. 334).

Ponctué ; marqué de petits points : feuilles de la



Sarriette (fig. 335) ; pétales de quelques *Saxifragas*.


Prolifère ; organe qui en produit un autre semblable à lui-même : *Poa vivipara*.

Pubérulent ; faiblement et brièvement pubescent.

Pubescent ; garni de poils fins, mous, courts et peu serrés : *Delphinium pubescens*.

Pulvérulent ; couvert d'une sorte de poussière : *Helianthemum pulverulentum*.

Pyxide ; capsule s'ouvrant circulairement à la maturité par la chute d'un



opercule, comme une boîte à savonnette : *Jusquiame*, *Pourpier*, *Anagallis* (fig. 336).


R

Racémiforme ; inflorescence en forme de grapp-



pe : *Sclerochloa dura* (fig. 337).



Rachis ; pétiole commun portant les folioles des feuilles composées, et axe primaire de quelques in-



florescences, telles que la panicule : Avoine, *Aspidium aculeatum* (fig. 338).


Radical ; qui naît de la racine ou de la souche : pédoncule radical, feuilles radicales.

Radicaux ; couché et émettant çà et là des racines : stolons de la Violette odo-




rante, de plusieurs *Carex* (fig. 340), *Renoncules* (fig. 339).

Radicelles ; petites racines secondaires naissant sur



la racine principale : *Bupleurum rotundifolium* (fig. 341).



Radiée ; fleur composée, offrant des fleurons au centre et des demi-fleurons à la circonférence : *Marguerite* (fig. 342), *Pâquerette*, *Arnica*, *Souci*.

Raméales ; feuilles situées



sur les rameaux : *Grémil violet* (fig. 343).

Rampant ; couché, étendu horizontalement sur le sol ou sous terre : *Goodyera repens*.

Réceptacle ; sommet élargi du pédoncule portant les diverses parties de la fleur, ou toute une inflo-




rescence comme dans les Composées : *Marguerite* (fig. 344), *Matricaire* (fig. 345).

Réfléchi ; recourbé en dehors vers la terre : calice




de la *Renoncule de Montpellier* (fig. 346) et bulbeuse.

Réfracté ; réfléchi sur lui-même brusquement comme par suite d'une cassure : *pédicelles fructifères de l'Holosteum* (fig. 347).



Régulier ; organe dont toutes les parties sont égales et symétriques : fleur de la *Renoncule*.

Réniforme ; en forme de rein ou de haricot : *Asaret* (fig. 348), feuilles




flottantes des *Renoncules aquatiques*, *graines de haricot* (fig. 349).

Réticulé ; surface marquée de lignes entrecroisées en réseau, comme les




mailles d'un filet : *feuilles du Goodyera* (fig. 350), *carpelles du Ranunculus arvensis* (fig. 351).

Rétus ; à sommet tronqué et légèrement déprimé : *silicule de la Bourse-à-pasteur* (fig. 352), fruit



du *Fumaria officinalis* (fig. 353).

Rhizome ; tige souterraine émettant des racines fi-





breuses et des tiges aériennes : *Trèfle d'eau* (fig. 354), *Sceau-de-Salomon*.

Rhomboidal ; en forme de losange : *feuilles de plu-*




sieurs *Amarantes* (fig. 355).



Ronciné ; feuille pennatifide, à lobes aigus et dirigés vers la base : *Laiteron* (fig. 356), *Pissenlit* (fig. 357).



Rosette ; feuilles étalées et



rapprochées en cercle : *Androsace maxima* (fig. 358).

Rostré ; en forme de bec.

Rotacé ; plan, étalé en roue : corolle de la *Bourrache*



(fig. 359), du *Bouillon-blanc* (fig. 360), de la *Véronique* (fig. 361).


Rugueux ; muni de rides ou inégalités qui le ren-



dent rude au toucher : fruit de l'*Hellébore* (fig. 362).


S

Sagitté ; en forme de fer de flèche : *feuilles de la Sagittaire* (fig. 363), de l'*Arum maculatum*.



Saillant ; qui dépasse le bord d'un organe (voir exsert).

Samare ; fruit sec, indéhiscent, monosperme, à bord




aminci en aile membraneuse : *Orme*, *Erable* (fig. 364).

Sarmenteux ; tige ou rameaux ligneux, flexibles, faibles, ayant besoin d'un appui : *Vigne*, *Clématite*.

Scabre ; très rude au toucher : *Garance*.

Scapiforme ; tige nue comme une hampe : *Arnose-*




ris pusilla (fig. 365), *Hieracium saxatile*, *Draba verna*.

Scarieux ; membraneux, mince et transparent, jamais vert : *Paronychia nivea*, *Dianthus prolifer*.

Scorpioïde ; roulé en queue de scorpion ou en crosse : inflorescence de l'*Héliotrope* (fig. 366) et de toutes les *Borraginées*.



Segment ; division d'une feuille se prolongeant



jusqu'à la nervure médiane: *Renoncule bulbeuse* (fig. 367).


Semi-flosculeuse ; fleur composée, formée uni-



quement de demi-fleurs : *Pissenlit*, *Epervière* (fig. 368).


Sépale ; division du calice (voir ce mot).

Sessile ; dépourvu de support, de pétiole, de pé-




doncule : *feuilles du Cytisus sessilifolius* (fig. 369).

Sétacé ; étroit, fin et raide comme une soie de porc ;



feuilles de plusieurs *Fesluca*, *rameaux des Prêles* (fig. 370).

Sétiforme ; qui a la forme




d'une soie : poils du *Papaver setigerum* (fig. 371).
Silicule ; petite silique dont la longueur n'égale pas



trois ou quatre fois la largeur : *Draba* (fig. 372), *Iberis*, *Lepidium*.

Silique ; sorte de capsule au moins trois fois plus longue que large, formée




de 2 valves séparées par une cloison portant les graines : *Chou* (fig. 373), *Moutarde*, *Giroflée*.

Silloné ; marqué de sillons ou raies longitudinales profondes : *tige de*





l'Equisetum palustre (fig. 374), et de plusieurs *Ombellifères*.

Simple ; non composé, non ramifié : feuille simple ;



poils simples de l'aigrette des Carduus (fig. 375).

Sinué ; à bords flexueux, à angles peu profonds et arrondis : *feuilles du Mat-*




thiola tricuspidata (fig. 376), du *Chêne blanc* (fig. 377), du *Specularia hybrida*.



Sinus ; échancrure comprise entre les lobes : feuilles du Chêne (fig. 377).


Soie ; poil long et raide : épi des *Setaria* (fig. 378).

Sore ; groupe des sporanges qui constituent la fructi-



fication des Fougères : *Polypodium vulgare* (fig. 379).


Souche ; partie souterraine de la tige des plantes vi-



vaces : *Renoncule tubéreuse* (fig. 380).



Soyeuse ; couvert de poils fins, doux comme la soie et couchés : feuilles de l'*Alchimilla alpina*.

Spadice ; inflorescence des Aroïdées, axe simple à fleurs mâles et femelles



sessiles : *Arum maculatum* (fig. 381 partie intérieure).

Spathe ; grande bractée membraneuse ou foliacée enveloppant quelques in-



florescences : *Arum* (fig. 381, *enveloppe extérieure*), *Ail* (fig. 382), *Iris* (fig. 383).

Sous-arbrisseau, plante sous-frutescente ; petit arbrisseau inférieur à un mètre et dont l'extrémité des rameaux herbacés se dessèche chaque hiver : Sauge officinale, Lavande, Thym.

Spatulé ; en forme de spatule, plan, élargi au som-




met, atténué dans le bas : Pâquerette, *Senecio spatulifolius* (fig. 384).

Spiciforme ; presque en forme d'épi : inflores-




cence du *Phleum asperum* (fig. 385), de la Flouve.

Spinescent ; se terminant en épine faible : feuilles



du *Cirsium monspessulanum* (fig. 386).

Spinuleuse ; couvert de petites épines ou spinules :



Pieris et *Helminthia echinoides* (fig. 387).

Spongieux ; à tissu poreux, compressible et élastique comme une éponge : écorce du Chêne-liège.

Spontané ; qui croît sans culture, à l'état sauvage : Chêne, Ronce, Bruyère.

Sporange ; espèce de capsule renfermant les spores des Acotylédones :



fructifications des Fougères, *Scolopendre* (fig. 388, très grossie), etc.


Spore ; corps reproducteur des végétaux cryptogames.

Squamiforme ; en forme d'écaille (voir ce mot).

Squamule ; petite écaille : tige de plusieurs *Leontodon* (fig. 389).



Staminifère; portant uniquement des étamines :




châtons mâles du *Saule cendré* (fig. 390), pieds mâles du Chanvre.

Station; nature ou état du sol où croît une plante.


Stigmate; sommet glanduleux du pistil (*voir ce mot*).

Stipité; porté sur un petit



support ou stipe : *gousse de Vicia hybrida* (fig. 391).


Stipules; appendices foliacés ou membraneux qui se trouvent à la base



d'un grand nombre de feuilles : *Trèfle* (fig. 392), Vesce.

Stipulé; muni de stipules.

Stolon; rejet rampant et radicant qui naît à la



base d'une tige et sert à la multiplication de la plante : *Fraisier*, *Violette odorante*, *Lierre terrestre* (fig. 393).

Stolonifère; pourvu de stolons.

Stries; petits sillons séparés par des côtes : calice du *Silene conica*.

Strié; muni de stries ou de veines : corolle du *Linaria striata*.

Strophiole; synonyme de Caroncule.

Style; petit filet qui surmonte l'ovaire et porte le stigmate (*voir pistil*).

Stylopode; disque qui couronne le fruit des Ombel-



lifères et qui porte les styles : *Cerfeuil sauvage* (fig. 394).


Sub; devant un autre mot signifie presque : subaigu, presque aigu; subsessile, presque sessile, etc.

Subéreux; ayant la nature et la consistance spongieuse du liège : écorce du *Chêne-liège* et de certains Ormes.

Subulé; qui se termine insensiblement en pointe très aiguë, comme une alène : *feuilles du Genévrier* (fig. 395), du *Polycnemum* (fig. 396).



Supère; ovaire libre au fond du calice ou de la corolle, par opposition à



infère ou adhérent : *Renoncule* (fig. 397. Voir aussi fig. A et B, page XXIII.)

Suture; ligne de jonction de 2 organes soudés ensemble, par exemple des 2 valves d'une gousse (*voir ce mot*).

Synanthérées; étamines soudées par les anthères et formant un tube dans




lequel passe le style : toutes les *Composées* (fig. 398).

T


Tablier; synonyme de Labelle (*voir ce mot*).

Terné; disposé par trois :



leurs de plusieurs *Teucrium* (fig. 396).

Tétradynames ; étamines au nombre de 6, dont 4



plus longues : *Chou* (fig. 400), Moutarde et la famille des Crucifères.

Tétragone ; à 4 angles : gousse du *Tetragonolobus* (fig. 401), tiges de la *La-*




vande (fig. 402), de la Menthe, de la Sauge et des autres Labiées.

Tétramètre ; à 4 divisions ou parties, par opposi-



tion à pentamètre : fleur de la *Tormentille* (fig. 403).



Thalamiflore ; plante dont les étamines, indépendantes du calice, sont insérées sur le réceptacle : *Renoncule* (fig. 404) et toute la classe des Thalamiflores.

Thyrse ; panicule ovoïde dont les pédicelles du



milieu sont plus longs que ceux des extrémités : Lilas, *Troëne* (fig. 405).

Tomenteux ; couvert d'une pubescence cotonneuse, entrecroisée, feutrée : jeunes Coings, *Cistus albidus*.


Toruleux ; offrant une série successive de renflements et d'étrangle-



ments : silique de la Ravenelle, gousse de l'*Ers* (fig. 406).


Traçant ; longuement rampant : souche du Chien-dent.

Trichotome ; divisé en trois parties, dont chacune se subdivise à son



tour en trois, et ainsi de suite plusieurs fois : panicule du *Silene italica* (fig. 407).

Tridenté ; à 3 dents : feuilles de *Globularia* (fig. 408), de l'*Hieracium tri-*




dentatum (fig. 409), folioles du *Vicia monanthos* (fig. 410).

Trifide ; fendu en 3 parties : lobes des feuilles de plu-



sieurs *Renoncules* (fig. 411).

Triflore ; portant 3 fleurs. **Trifoliolé** ; à 3 folioles :



Trèfle (fig. 412) et nombreuses Papilionacées.




Trigone; à 3 angles : *tige* de plusieurs *Carex* (fig.



413); *fruit* du *Sarrasin* (fig. 414).

Trilobé; à 3 lobes : *feuilles*




de l'*Anemone Hepatica* (fig. 415).

Triloculaire; à 3 loges :





capsule de l'*Asphodèle* (fig. 416), du *Lis*.

Trinervé; à 3 nervures : *Aster trinervis* (*feuilles*)



(fig. 417), *valves* de la *silique* du *Brassica Cheiranthus* (fig. 418).

Tripartit; divisé jusque près de la base en trois partitions : *feuilles* de la *Renoncule tripartite* (fig.




419); *épines* et *feuilles* de la *Lampourde épineuse* (fig. 420).

Tripennatiséqué; 3 fois pennatiséqué : *feuilles* de



plusieurs *Fougères* (fig. 421) et *Ombellifères*.

Triquètre; à 3 angles saillants, amincis et comme



tranchants : *tige* du *Carex riparia* (fig. 422).

Triséqué; à 3 segments : *feuilles* du *Ranunculus re-*



pens (fig. 423); *Podagraire* (fig. 424).




Trisperme; à 3 graines :



Capsule du *Montia* (fig. 425), de l'*Asphodèle*.

Triternatiséqué; 3 fois divisé en 3 segments : *feuil-*



les de certains *Ranunculus* (fig. 426) et *Thalictrum*.

Trivalve; fruit s'ouvrant en 3 valves : *Violette*,




Asphodèle, *capsule* de la *Pensée* (fig. 427).

Tronqué; coupé brusquement par une ligne transversale : *folioles* du *Vicia*




sativa (fig. 428); *graines* du *Leonurus Cardiaca* (fig. 429).

Tubercule; renflement souterrain de la *tige* ou de




la racine : Pomme de terre, Pivoine, *Orchis* (fig. 430); granules qui recou-



vrent certains fruits ou certaines graines : *Arbousier* (fig. 431).

Tuberculeux, tubéreux; pourvu de 1 ou plusieurs tubercules.

Tunique, tégument; membrane qui enveloppe un



organe : bulbe du *Colchique* (fig. 432).

Turbiné; en forme de toupie un peu déprimée au



sommet ou en cône renversé : Nèfle, *silicule* du *Camelina fatida* (fig. 433).

Turion; jeune tige naissant de la souche d'une plante vivace : *Asperge* (fig. 434), Rose, Ronce.



U

Unciné (voir onciné).


Uniflore; qui ne porte qu'une fleur : *Violette*, *Tulipe*.

Unilabié; à 1 seule lèvre :



corolle des *Teucrium* (fig. 435), des *Ajuga*.

Unilatéral; disposé ou tourné d'un seul côté : *fleurs*




de la *Digitale* (fig. 436), du *Silene gallica*.

Uniloculaire; à 1 seule




loge : capsule de la *Silène* (fig. 437), du *Réséda*.




Uninervé; marqué d'une seule nervure : valves de la *silique* du *Barbarea* (fig. 438).

Unisérié; disposé sur 1 seul rang : graines des *Bras-*



sica (fig. 439), des *Barbarea* et de nombreuses *Crucifères*.

Urcéolé; en forme de grelot, renflé au milieu et resserré aux 2 bouts : *co-*




rolle de l'*Airelle* (fig. 440), de la *Busserole* (fig. 441), du *Muscari*.



V


Valves; pièces composant l'enveloppe des fruits dé-



hiscents : *silicule* du *Lunaria biennis* (fig. 442).

Vasculaire; végétal dont le tissu est composé de petits vaisseaux ou tubes courts, unis à des fibres et à des cellules : se dit par opposition à Cellulaire et s'applique à tous les végétaux supérieurs, les seuls dont il s'agit dans cette Flore.


Veiné; marqué de veines ou petites nervures ramifiées et apparentes : *calice du Silene inflata* (fig.



443), corolle de la *Jusquiame* (fig. 444), gousse du *Lathyrus sphæricus* (fig. 445).

Velouté; couvert de petits poils courts et épais, doux au toucher comme le velours : *Pêche*.

Velu; couvert de poils longs, mous et rappro-




chés : *Ranunculus nemorosus* (fig. 446).

Verruqueux; hérissé d'aspérités ou de tubercules semblables à de petites




verrues : capsule de plusieurs *Euphorbes* (fig. 447).

Verticille; ensemble d'organes rangés en cercle autour d'un axe : *feuilles*



de la *Garance* (fig. 448) et de toutes les *Rubiacees*.

Vésiculeux; en forme de vésicule ou de petite ves-



sie : gousse du *Baguenaudier* (fig. 449).

Visqueux; s'attachant aux corps comme la glu : *sommités de plusieurs Silènes*.

Vivace; plante dont la racine vit plusieurs années ou indéfiniment : *Violette*, *Hellébore*, *Lis*.



Vivipare; fleur qui se trans-

forme en bourgeon foliacé : *Poa vivipara*.

Voluble ou **volubile**; tige qui s'enroule autour des corps voisins : *Houblon* (fig. 450), *Cuscuta*, *Liseron* (fig. 451), *Haricot*.



Virille; filaments volubles de certaines plantes s'enroulant en spirale autour



des corps voisins : *Vigne*, *Bryone*, *Pois* (fig. 452), *Vesce*, *Lathyrus* (fig. 453).